

Fachpersonal

octenisept® Vaginaltherapeutikum

Immer die richtige
Empfehlung

Wirkt bei bakteriellen UND pilzbedingten Infektionen¹

- **Schnelle Linderung** von Brennen, Jucken, Rötungen und Intimgeruch
- Hilft auch bei **wiederkehrenden Infektionen** (z.B. nach Clotrimazol-Anwendung)
- Unterstützt die **Wiederherstellung der Vaginalflora**
- Eignet sich auch zur **Behandlung des Partners** und bei **Schwangeren²**
- Ist **farblos** und **fleckenfrei**

Inklusive
Applikator


Optimale Beratungs- empfehlung

bei nicht vorhandener
Differentialdiagnose



PZN: 00615641

Vaginale Dysbiosen: Häufigste Infektionen³



Tipps für die Beratung:

Regulatorischer Status	Apothekenpflichtiges Arzneimittel
Indikation	Zur Linderung der Symptomatik bei bakteriell oder durch Pilzinfektion (Candidosen) bedingtem Juckreiz, Brennen und Ausfluss im Vaginalbereich.
Anwendung* >> Nicht in Kombination mit PVP-Iod <<	Mithilfe des Applikators in die Vagina einführen <ul style="list-style-type: none"> • 10 Sprühstöße je Anwendung • Applikator und Sprühkopf reinigen Für den Mann mit aufgesetzter Sprühkappe auf das männliche Genital bis zur vollständigen Benetzung aufsprühen. 7 Tage (oder gem. der Empfehlung des Arztes) am 1. Tag morgens und abends anwenden, an Folgetagen 1 x täglich Für Schwangere geeignet ²
Alter	Ab 8 Jahren
Haltbarkeit	3 Jahre
Wirkstoffe**	1 mg/g Octenidindihydrochlorid, 20 mg/g Phenoxyethanol

¹Candidosen ²Ab dem 4. Monat ³Sobel JD, Subramanian C, Foxman B, Fairfax M, Gygax SE. Mixed vaginitis-more than coinfection and with therapeutic implications. *Curr Infect Dis Rep.* 2013;15(2):104-8.; Poole DN, McClelland RS. Global epidemiology of *Trichomonas vaginalis*. *Sex Transm Infect.* 2013;89(6):418-22.; Palmeira-de-Oliveira R, Palmeira-de-Oliveira A, Martinez-de-Oliveira J. New strategies for local treatment of vaginal infections. *Adv Drug Deliv Rev.* 2015;92:105-22.; Holzer I. Gefahr der Frühgeburt durch Scheideninfektionen. *Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Österreich.* 2019;29(4):151-. "Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage" "Für eine vollständige Übersicht der Inhaltsstoffe Packungsbeilage beachten"

octenisept® Vaginaltherapeutikum • Wirkstoffe: Octenidindihydrochlorid, Phenoxyethanol (Ph. Eur.). **Zusammensetzung:** 100g Lösung enthalten: 0,1g Octenidindihydrochlorid, 2,0g Phenoxyethanol (Ph. Eur.). Sonstige Bestandteile: 2-[(3-Kokosfettsäureamidopropyl)dimethylazaniumyl]acetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Antiseptikum zur Behandlung von Vaginalinfektionen. Linderung der Symptomatik bei bakteriell oder durch Pilzinfektion (Candidosen) bedingtem Juckreiz, Brennen und Ausfluss im Vaginalbereich. **Gegenanzeigen:** Allergie gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. Für die Anwendung bei Kindern unter 8 Jahren liegen noch keine ausreichenden Erfahrungen vor. **Nebenwirkungen:** Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. Sehr selten sind kontaktallergische Reaktionen, wie z.B. eine vorübergehende Rötung an der behandelten Stelle möglich. **Warnhinweise:** octenisept® Vaginaltherapeutikum nicht in größeren Mengen verschlucken oder in den Blutkreislauf gelangen lassen. Stand 01/21 Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-666, info@schuelke.com

octenisept®
e-learning
Hier scannen:

